


Behandlingsbegränsningar på IVA

Fulla åtgärder
Ingen dialys
Ej HLR
Ingen intubation
Non-invasiv ventilation ska utföras
Defibrillering ska utföras

Avstå och avbryta behandling på IVA, inskrivningsperiod 2013-01-01 - 2013-12-31



$E_j \text{ HLR} = ?$

$$E_j \text{ HLR} = E_j \text{ HLR}$$

Syfte

Kartlägga förekomsten av begränsningar av livsuppehållande behandling på IVA samt överlevnaden hos patienter med sådana begränsningar.

Centrallasarettet i Växjö

- Länssjukhus
- Primärt upptagningsområde: ca 130000 inv
- IVA, 6 platser
- Cambio Cosmic



Vårdtillfällen på IVA 2013

536

Vårdtillfällen på IVA 2013

536

Vårdtillfällen med beslut om behandlingsstrategi i för detta
avsedd mall, som varit giltigt under vårdtiden på IVA

98

Vårdtillfällen på IVA 2013

536

Vårdtillfällen med beslut om behandlingsstrategi i för detta
avsedd mall, som varit giltigt under vårdtiden på IVA

98


Sista beslut under
vårdtillfället på IVA

Begränsning av
livsuppehållande behandling


95

Fulla åtgärder

3




Antal vårdtillfällen med behandlingsbegränsning



Vårdtillfällen med behandlingsbegränsningar

% av åldersgrupp

(antal vtf med begränsningar/ totala antalet vtf, i respektive åldersgrupp)



Könsfördelning

	Vårdtillfällen	Vårdtillfällen med behandlingsbegränsningar	%
Totalt	536	95	18%
Kvinnor	231	40	17%
Män	305	55	18%

Beslut om att **avstå**


från livsuppehållande behandling

87 vårdtillfällen (vtf)

Vanligast

- Avstå från hjärt- och lungräddning – 82 vtf
- Avstå från invasiv ventilation - 59 vtf
- Avstå från HLR som enda begränsning - 14 vtf
- Avstå från intensivvård – 17 vtf

Överlevnad hos patienter med behandlingsbegränsningar



I gruppen som överlevde > 90 d efter utskrivning från sjukhus

hade vid urdrag ur SIR:s register **okt 2014**

- **5 av patienterna avlidit**
överlevnad efter utskrivning från IVA 133-538
dagar (medel 290)
- **13 patienter levde fortfarande**, de hade **då**
levt 344-630 dagar (medel 482) efter
utskrivning från IVA

Sammanfattning

- 18% av IVA-patienterna hade begränsningar av livsuppehållande behandling
- Knappt en femtedel av dessa skrevs ut levande från sjukhus
- Av de som skrevs ut levde mer än hälften av fortfarande ett år efter utskrivning från IVA
- Av patienter som avled på IVA hade 70% begränsningar av livsuppehållande behandling

Andra upptäckter på vägen...

- Besluten dokumenteras inte som vi trodde
- Det finns flera tolkningar av hur vi ska dokumentera.
- Det är krångligare att ta fram data ur journalsystemet än jag trodde.
- Påverkar journalmallarnas utformning vad vi dokumenterar?





TACK!